



METACLOR

ميتاكلور



ACI

Herbicide à base de S-Métolachlore EC (960 g/l)

Herbicide

Metaclor, l'herbicide le plus fort !
ميتاكلور، أقوى مييد للأعشاب!



Numéro homologation : F11-9-017



ACI Equipments

METACLOR ميتاكلور

ACI

Herbicide

Herbicide sélectif pour la lutte contre les graminées et dicotylédones annuelles sur Maïs

METACLOR est un herbicide sélectif à base de S-métolachlore qui assure un contrôle contre les graminées et dicotylédones, ainsi qu'une meilleure sélectivité pour le maïs ;

METACLOR agit entre la germination et la levée des mauvaises herbes. Positionné dans la couche superficielle du sol, il détruit les adventices sensibles dès leur germination ou pendant leur levée.

Les usages agricoles :

Usage	Dose(s) P.C	Max. Appli.	Epoque
Maïs Adventices Dicotylédones et Graminées annuelles	1,5 l/ha	1	pré-émergence et juste après semis

Moment de l'application :

1. Après le semis, avant la germination : Appliquer **METACLOR** pendant ou après le semis, mais avant la germination des cultures et des mauvaises herbes.

2. Avant le semis par incorporation : Traiter le sol avec **METACLOR** et l'incorporer à une distance maximale de 5 cm de la surface et dans les 14 jours précédant le semis, à l'aide d'une herse, d'un cultivateur ou d'une machine similaire. Procéder à l'incorporation avant le semis lorsqu'un temps sec est prévu dans la période qui suit le traitement.

Dans des conditions de sécheresse superficielle et dans les régions où il n'y a pas de précipitations après le traitement, **METACLOR** doit être utilisé avant le semis avec une incorporation superficielle. L'incorporation doit être superficielle et ne pas dépasser 5 cm de profondeur.

ميتاكلور مبيد أعشاب انتقائي يعتمد على S-ميتولاكلور الذي يوفر التحكم في الحشائش ثنائية الفلقة والعشبية، بالإضافة إلى انتقائية أفضل للذرة؛

يعمل **ميتاكلور** على منع إنبات الأعشاب الضارة وظهورها. عند وضعه في الطبقة السطحية من التربة، فإنه يقضي على الحشائش الحساسة بمجرد إنباتها أو أثناء ظهورها.

الإستعمال الفلاحي

فترة	الحد الأقصى للتطبيق	المقدار	الإستعمالات
قبل الظهور وبعد البذر مباشرة	1	1,5 l/ha	الأعشاب ثنائية الفلقة و النجيليات الموسمية الذرة

وقت التطبيق

1. بعد الزراعة، قبل الانبات: يطبق **ميتاكلور** أثناء أو بعد الزراعة، ولكن قبل انبات الزرع والحشائش.

2. قبل الزراعة عبر الدمج: قم بمعالجة التربة بواسطة **ميتاكلور** وادمجها بعمق لا يتجاوز 5 سم من سطح التربة، وذلك في غضون 14 يوماً قبل الزراعة، باستخدام مثل: ممهدة، محراث، أو آلة مماثلة. قم بالدمج قبل الزراعة عند توقع فترة جافة في الفترة التي تلي المعالجة.

في ظروف جفاف سطحي وفي المناطق التي لا توجد فيها أمطار بعد المعالجة، يجب استخدام **ميتاكلور** قبل الزراعة مع دمج سطحي. يجب أن يكون الدمج سطحي ولا يتجاوز عمق 5 سم.

